



ਗਰੁੱਪ ਏ. ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼

Group A Streptococcal Infections

ਗਰੁੱਪ ਏ.ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਗਰੁੱਪ ਏ.ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ (ਜੀ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪ) (Group A Streptococcus (GAS or “strep”)) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਝਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ (ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ) ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ (sinus) ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਲਸਿਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (lymph glands) ਦੇ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਟਾਂਵੀਂਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਸੀਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਫੇਫ਼ਡਿਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਲੇ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ, ਪੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਫੇਫ਼ਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਝਾਰ ਅਤੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੇਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਏ.ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ (ਆਈਗੈਸ ਵੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ ਟਾਕਸਿਕ ਸੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (streptococcal toxic shock syndrome) ਅਤੇ ਨੈਕ੍ਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੇਸੀਟਿਸ (necrotizing fasciitis) ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਲੇਟ ਫੀਵਰ (scarlet fever), ਰਿਊਮੈਟਿਕ ਫੀਵਰ (rheumatic fever), ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਲੋਮੇਰਿਊਲੋਨਫਰਾਈਟਸ (glomerulonephritis) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀ.ਏ.ਐਸ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ (Strep throat) ਇਹ ਰੋਗ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਝਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਗਲਾ ਅਤੇ ਘੰਡੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਸਿਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਪੱਥੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਪੈਟਾਈਗੋ (Impetigo) ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਗਾਸੀਮ ਸੱਟ ਜਾਂ ਭਰੀਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ, (HealthLink BC File) #81 ਵੱਡੇ ਫਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਟਾਕਸਿਕ ਸੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (Toxic shock syndrome) ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਏ.ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਰਕਤ ਚਾਪ (blood pressure) ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਦਮਾ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਗਾਸੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਕਸਿਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਸਿਵ ਜੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸਿਕ ਸ਼ਾਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫ਼ਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੀ.ਐਸ.ਐਸ. (TSS) ਸਟੈਫਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ (Staphylococcus aureus) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਪੂਨ ਹਨ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ (HealthLinkBC File) #04 ਟਾਕਸਿਕ ਸ਼ਾਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇਖੋ।

ਨੈਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੇਸੀਟਿਸ (Necrotizing fasciitis) ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੰਤੂ ਜਾਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਚੋਟ ਕੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਰਗੜ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ (HealthLinkBC File) #60 ਨੈਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੇਸੀਅਈਟਿਸ ਦੇਖੋ।

ਸਕਾਰਲੈਟ ਫੀਵਰ (Scarlet fever) ਇਹ ਰੋਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚਟਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਟਾਕ ਰੇਗਮਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ

ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹੇ, ਜੀਭ ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਊਮੈਟਿਕ ਫੀਵਰ (Rheumatic fever) ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਪ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਪ ਬਰੋਟ ਦੀ ਬੜੀ ਟਾਂਵੀਂ ਉਲੱਝਣ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁਆਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਜੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਮਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ, ਕਾਂਟੇ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

- ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ (HealthLinkBC File) #85 ਮਾਧਿਅਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਦੇਖੋ।
- ਸਟ੍ਰਾ, ਕੱਪ, ਬੋਤਲ, ਕਾਂਟਾ, ਚਮਚ, ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਕੁਝੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਛ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਖੰਘੋ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਸੋਜਸ਼, ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਦ ਦਾ ਨਿਕਲਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਧਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
- ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲ (HealthLinkBC File) #44b ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਵੈਗੀਸੇਲਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਖੋ।
- ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 7-1-1 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

