



# 장미진 Roseola

## 장미진이란?

장미진은 바이러스에 의한 흔한 질병으로서 주로 생후 6개월 내지 만 2세 아동에게 발병하며, 일반적으로 병세가 경미합니다. 장미진에 걸려도 아프지 않고 낫는 경우가 많습니다.

### 어떤 증상이 나타나나?

장미진에 걸린 아동은 열이 나며 갑자기 체온이 급상승합니다. 39.5°C를 넘을 경우도 있는 이 체온 급상승은 열성경련을 일으킬 수 있습니다. 자녀가 경련이 일어나면 겁이 잔뜩 날 수 있지만, 경련은 불과 몇 분 지속될 뿐이며 아이에게 아무 해도 입히지 않습니다. 3-5일 이내에 체온이 정상으로 돌아옵니다.

열이 내리면 약 24시간 후에 장미진 발진이 생깁니다. 아이의 목, 가슴 및 몸통에 작은 분홍빛 또는 붉은 반점이 나타납니다. 이 발진은 길게는 2일 지속될 수 있습니다. 장미진의 주요 특징의 하나는 발열이 끝난 후에 발진이 나타난다는 것입니다. 대부분의 다른 아동 질환에서는 발열과 발진이 동시에 발생합니다.

아이가 편안해 보였다가 짜증난 것처럼 보였다가 할 수 있지만, 일반적으로 음식을 평소처럼 정상적으로 섭취합니다. 콧물, 설사, 구토, 목의 분비선 부종 등의 다른 증상이 나타날 수도 있지만 모든 아동에게 이런 증상이 나타나는 것은 아닙니다.

# 아이를 언제 보건의료 서비스 제공자에게 데려가야 하나?

열이 내리고 발진이 나타날 때까지는 아이가 장미진에 걸렸는지 확실히 알 수가 없습니다. 자녀가 고열만 있고 다른 증상이 없을 경우, 8-1-1로 전화하여 공인간호사와 상담하십시오. 간호사는 보건의료 서비스 제공자에게 진찰을 받도록 권유하거나, 아이의 병이 중하다고 생각되면 응급실로 데려가라고 할 수 있습니다.

아이의 상태가 점점 악화되거나, 고열이 있거나, 목이 뻣뻣하거나, 계속 잠만 자거나, 힘이 없거나, 짜증을 낼 경우에는 즉시 가까운 응급실로 데려가십시오. 더 중대한 병이 난 것일 수 있습니다.

자녀가 발작이 일어났을 경우, 되도록 빨리 보건의료 서비스 제공자에게 진찰을 받아 중대한 병이 아닌지 확인하십시오. 보건의료 서비스 제공자를 만날 수 없을 경우에는 가까운 종합병원 응급실로 가십시오.

열성경련에 관해 자세히 알아보려면 <u>HealthLinkBC File #112 열성경련</u>을 참고하십시오.

## 장미진은 어떻게 전염되나?

장미진은 감염자가 말을 하거나, 웃거나, 기침 또는 재채기를 할 때 코와 목에서 튀어 나온 침 또는 미세한 체액 비말을 통해 전염됩니다. 장미진에 걸린 아동이 다른 사람에게 병을 옮길 수 있는 기간은 아직 알려지지 않았습니다.

### 자택 치료는 어떻게 하나?

자녀를 간호하는 방법은 다음과 같습니다:

- 편안하게 해주십시오. 옷을 가볍게 입히십시오(셔츠와 반바지 또는 기저귀만).
- 열을 내려주십시오. 열이 내려갈 때까지 침대에 누워 편히 쉬어야 합니다. 체온이 높을 경우에는 아세타미노펜 또는 이부프로펜을 먹이십시오.\*

발열 또는 동통에는 아세트아미노펜(Tylenol® 등) 또는 이부프로펜\*(Advil® 등)을 쓸 수 있습니다. 만 18 세 미만 아동/청소년은 라이증후군 위험이 있으므로 ASA(Aspirin® 등)를 복용하면 안됩니다.

\*생후 6개월 미만 영아에게는 보건의료 서비스 제공자와 상담하지 않고 이부프로펜을 먹이면 안됩니다. 라이증후군에 관해 자세히 알아보려면 HealthLinkBC File #84 라이증후군을 참고하십시오.

 액체를 많이 마시게 하십시오. 열은 몸의 수분을 빼앗아가므로 액체를 많이 마셔야 합니다. 음식은 덜 중요합니다. 아이가 배가 고플 경우에는 먹어도 좋지만, 식욕이 없을 경우에는 끼니를 몇 번 걸러도 괜찮습니다.

항생제로는 장미진을 치료할 수 없습니다. 보건의료 서비스 제공자가 항생제를 처방해줄 경우는 세균성 질병에 의해 열이 난 것일 수 있습니다.

열과 발진이 없어지면 곧바로 탁아소에 가거나 놀이터에 놀러 가는 등, 사회 활동을 재개할 수 있습니다. 장미진에 걸렸다가 다 나아서 탁아소에 다시 나갈 경우, 최근의 병에 대해 탁아소에 알리십시오.

