



髄膜炎菌 C 型混合(Men-C)ワクチン Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine

お子様の安全を守りましょう。
すべてのワクチンを予定通り接種してください。

すべてのワクチンを予定通りに接種することで、
生涯にわたり多くの病気からお子様を守ることが
できます。

予防接種は過去 50 年間、カナダにおいて他のどの健康
対策よりも多くの命を救ってきました。

Men-C ワクチンとは何か？

Men-C ワクチンは、最も一般的な髄膜炎菌の 1 つである
C 型からの感染を防ぎます。このワクチンはカナダ保健省
によって承認されています。

Men-C ワクチンは、お子様の定期予防接種の一環として
、無料で接種できます。医療提供者に電話し、予約して
ください。

誰が Men-C ワクチンを接種するべきか？

Men-C ワクチンは、2 回に分けて幼児に接種を行います。
1 回目は、生後 2 か月に、2 回目は生後 12 か月後に接
種します。このワクチンは、他の子供向けワクチンと同じ時
期に接種します。

Men-C ワクチン	子供のワクチン接種年齢
1 回目接種	生後 2 か月
2 回目接種	生後 12 か月

以下に該当する場合、ワクチンを接種する場合があります
:

- 24 歳以下の方で、2002 年以前に生まれ、10 歳の誕
生日以降にワクチンを接種しなかった場合
- 髄膜炎菌 C 型感染患者の濃厚接触者となった場合
全ての予防接種を記録することは重要です。

ワクチンの恩恵とは？

髄膜炎菌 C 型感染から守るこのワクチンは、重度で時に
致命的なこの病気から子供を守る最適な方法です。

お子様がワクチンを接種することで、周りの人を守ることに
もつながります。

ワクチン接種後に起こりうる副作用とは？

ワクチンは非常に安全です。髄膜炎菌感染症にかかるよ
り、ワクチンを接種する方がずっと安全です。ワクチンによ
る一般的な副作用には、ワクチン接種箇所の痛み、発
赤、腫れなどがあります。発熱、眠気、不機嫌、食欲不
振、吐気、嘔吐、下痢、頭痛、筋肉痛が、ワクチン接種
後 24 時間以内に発生する可能性もあります。これらの
副作用は軽度で、通常 1 日から 2 日続きます。

発熱や痛みがある場合、アセトアミノフェン(例：タイレノール
®)またはイブプロフェン(例：アドビル®)を服用することがで
きます。ASA(例：アスピリン®)は、ライ症候群のリスクがあ
るため、18 歳未満の方は服用しないでください。

*かかりつけ医と相談せずに、イブプロフェンを生後 6 か月
のお子様には服用することはしないでください。

ライ症候群に関する情報は、[ヘルスリンク BC ファイルの #84 ライ症候群](#) を参照してください。

100 万人に 1 人未満の割合と、アナフィラキシーと呼ばれる命に関わるアレルギー反応がでる可能性は非常にまれですが、反応が出た場合に備え、ワクチン接種後 15 分間は診療所に滞在することが重要です。アナフィラキシーの症状には、蕁麻疹、呼吸困難、咽喉、舌、唇の腫れなどがあります。これらの症状が出た場合、医療提供者は治療することができます。緊急治療にはエピネフリン(アドレナリン)の投与と救急車で最寄りの救急科への搬送が含まれます。診療所を去った後に症状が出た場合、**9-1-1** または地域の緊急電話番号にお電話ください。

重度または予期しない副作用が出た場合は常に、医療提供者に報告することが重要です。

Men-C ワクチンを接種すべきでないのは誰か？

お子様が以前接種した髄膜炎菌ワクチンまたは他のワクチンにより生命を脅かす反応を示した場合、医療提供者に相談してください。

風邪やその他軽度の病気により、ワクチン接種を遅らせる必要はありません。ただし、心配な場合は、医療提供者にご相談ください。

髄膜炎菌 C 型感染症とは何か？

髄膜炎菌 C 型感染症は、髄膜炎菌 C 型と呼ばれる細菌によって引き起こります。この感染症により、髄膜炎、脳被膜感染症、血液の感染症である敗血症など、重度

で生命を脅かす感染症が発症する場合があります。100 人の感染者のうち、たとえ治療を受けても最大 15 人の感染者が亡くなります。感染の永久的合併症として、脳障害、難聴、手足の欠損などがあります。

髄膜炎菌感染症は、咳やくしゃみ、対面による密接な接触によって人から人へ感染します。また、唾液を介して感染する場合があります。新生児や幼児は、他の子供が使用するおしゃぶり、哺乳瓶、おもちゃを共有することで病気になる可能性があります。年長の子供や成人は、キスや、食べ物、飲み物、タバコ、口紅、水筒、スポーツで使われるマウスガード、あるいは楽器のマウスピースを共有するなどの活動を通じて感染する場合があります。

髄膜炎菌性 C 型感染症の発症は、定期的子供向け予防接種プログラムにより、現在 BC 州でまれです。

成熟した未成年者の同意

予防接種の同意について、ご両親または保護者の方とお子様で話し合うことが推奨されています。それぞれのワクチンによる恩恵と起こりうる副作用、および予防接種を受けない場合のリスクが理解できる 19 歳未満の子供は、法的にワクチン接種に対し、同意あるいは、拒否することができます。成熟した未成年者の同意の詳細については、[ヘルスリンク BC ファイル #119 乳幼児法、成熟した未成年者の同意および予防接種](#) をご確認ください。

予防接種の詳細については、予防接種 BC <https://immunizebc.ca/> にアクセスください。



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

ヘルスリンク BC ファイルピックアップに関する詳細は、www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files をご確認ください。ただか、最寄りの公衆衛生局へお立ち寄りください。緊急を要しない BC 州における健康情報および助言については、www.HealthLinkBC.ca をご覧いただくか、**8-1-1** (フリーダイヤル) までお電話ください。聴覚障害者の方および耳の不自由な方は、**7-1-1** へお電話ください。ご希望により、130 以上の言語で翻訳サービスがご利用いただけます。