

Calendario de vacunación para adultos, personas de la tercera edad e individuos en alto riesgo de B.C.

Vacuna	Adulto	65 años o más	Programa de alto riesgo [†]
<u>Vacuna contra la varicela</u> (#44b) ¹	<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna contra la hepatitis A</u> (#33)			<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna contra la hepatitis B</u> (#25a) ²	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH)</u> (#101b) ³	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna desactivada contra la influenza (gripe)</u> (#12d) ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR)</u> (#14a) ⁵	<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C)</u> (#23a) ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacunas meningocócicas cuadrivalentes</u> (#23b) ⁷	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13)</u> (#62a)			<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna neumocócica polisacárida</u> (#62b)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna contra el tétanos y la difteria (Td)</u> (#18a) ⁸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina (DTPa)</u> (#18c) ⁹	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** si tiene dudas. Esta tabla de inmunización ha sido desarrollada y revisada por HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio de Salud de B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de control de enfermedades de B.C.).

[†] **Programa de alto riesgo:** La Colombia Británica administra muchas vacunas gratuitamente a algunos grupos de personas. Por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas o el sistema inmunitario debilitado pueden recibir vacunas de manera gratuita. Contacte con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** para obtener más información.

¹ Se recomienda que los adultos que no han sido vacunados reciban dos dosis de la vacuna. Es posible que algunos adultos no necesiten recibir la vacuna. Si ha tenido la varicela o el herpes zóster después de cumplir un año de edad, y si tuvo la enfermedad antes de 2004, o si esto ha sido confirmado por una prueba de laboratorio, no necesita recibir la vacuna.

² La vacuna contra la hepatitis B se administra de manera gratuita a personas nacidas en 1980 o posteriormente que nunca hayan recibido la vacuna o que no hayan recibido el número de dosis recomendadas para su edad.

³ La vacuna VPH (HPV, por sus siglas en inglés) se administra de manera gratuita a adultos que cumplan los requisitos y que tengan 26 años de edad o menos.

⁴ Se recomienda vacunarse anualmente contra la influenza (gripe) y la vacuna se administra de forma gratuita. Se recomienda especialmente a las personas con alto riesgo de enfermar de gravedad por influenza y a las que pueden contagiar a otras personas con alto riesgo.

⁵ Cualquier persona nacida en 1970 o posteriormente que no haya sido inmunizada o que no tenga inmunidad contra el sarampión, las paperas y la rubéola debería recibir 2 dosis de la vacuna SPR (MMR, por sus siglas en inglés).

⁶ La vacuna Men-C se administra de manera gratuita a personas nacidas antes de 2002 que tienen 24 años de edad o menos y que no han recibido una dosis de la vacuna al cumplir 10 años de edad o posteriormente.

⁷ La vacuna meningocócica conjugada cuadrivalente se administra de manera gratuita a las personas nacidas en 2002 o después que tengan 24 años o menos y no hayan recibido una dosis de la vacuna en la adolescencia.

⁸ La vacuna Td se administra a adultos que no han sido vacunados o cuyo historial de inmunizaciones se desconoce. Se recomienda recibir una dosis de refuerzo de la vacuna cada 10 años. Si tiene un corte o una herida grave y corre un alto riesgo de una infección por tétanos, es posible que se le recomiende recibir la vacuna.

⁹ La vacuna DTPa (Tdap, por sus siglas en inglés) se administra de manera gratuita a adultos que no han sido vacunados siendo más pequeños o cuyo historial de inmunización se desconoce. También se recomienda y se administra gratuitamente a las mujeres embarazadas en todos los embarazos, independientemente de su historial de vacunación. La vacuna se recomienda, pero no se administra gratuitamente, a los adultos mayores de 18 años que fueron vacunados contra la tos ferina en la infancia pero no han recibido una vacuna que contenga tos ferina en la edad adulta.